

BOLETÍN OCEANOGRÁFICO

Semana 44 del 27 de octubre al 2 de noviembre 2025

Milena Pizarro Revello, Darly Alarcón Paredes
Departamento de Oceanografía y Medio Ambiente (DOMA)

ESCALA REGIONAL:

En su boletín de octubre la NOAA cambió el estatus de **Vigilancia de La Niña a Advertencia de La Niña**. La información de septiembre indicó que el sistema acoplado océano-atmósfera reflejó condiciones La Niña, las que se pronostican se mantengan hasta diciembre 2025-febrero 2026 con una probable transición a un ENOS neutral entre enero y marzo de 2026 (55%) (NOAA, 2025). La región Niño 1+2 (**Figura 1, Ecuador y norte de Perú**) presentó valores positivos de las ATSM entre febrero y junio, con valores que en su mayoría superaron el umbral para condición cálida ($>+0,5^{\circ}\text{C}$), descendiendo a valores neutros ($<\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) entre julio y septiembre. En tanto, en la región Niño 3.4 (**Figura 1, Pacífico central**), los promedios mensuales de ATSM entre febrero y septiembre se mantuvieron en niveles neutros (en el rango inferior a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$).

En la actual semana: La imagen correspondiente al 4 de octubre (**Figura 2**) muestra que en la región ecuatorial se mantuvo la gran cobertura de ATSM negativas ($-0,5^{\circ}\text{C}$ a -2°C) debilitado en relación a la semana anterior y una intensificación de los focos cálidos existentes ($+3^{\circ}\text{C}$). En la costa del Ecuador la condición cambió a fría (-2°C) mientras que, en la costa peruana se mantuvo cálida ($+1^{\circ}\text{C}$) al igual que en la costa norte chilena ($+0,5^{\circ}\text{C}$). Entre Valparaíso y el golfo de Arauco la condición fue neutra con tendencia fría, condición que cambió a cálida hacia el sur de los 37°S .

EN RELACIÓN A LA CONDICIÓN SEMANAL DE LA COSTA CHILENA:

En la **ZONA NORTE (Figura 1a)**, durante la semana 44, la condición oceanográfica se mantuvo cálida (**Figura 3**), con una ATSM promedio semanal de $+0,7^{\circ}\text{C}$ en la subzona norte ($+0,5^{\circ}\text{C}$ en la semana anterior), y de $+0,7^{\circ}\text{C}$ en la subzona sur ($+0,7^{\circ}\text{C}$ en la semana anterior). La distribución semanal de las ATSM (**Figura 1a, panel derecho**) mostró un predominio valores positivos ($+0,5^{\circ}\text{C}$) a lo largo de la costa, manteniendo la cobertura de valores positivos en el resto de la zona. En resumen, durante la semana 44, la costa de la **ZONA NORTE** presentó una condición cálida.

En la **ZONA CENTRO-NORTE (Figura 1b)**, durante la semana 44 la condición oceanográfica fue similar a la de la semana anterior (**Figura 3**), en este sentido, la subzona norte se mantuvo cálida con un valor de ATSM promedio semanal de $+0,8^{\circ}\text{C}$ ($+0,8^{\circ}\text{C}$ en las dos semanas anteriores), y se mantuvo neutra en la subzona sur con un valor de $-0,2^{\circ}\text{C}$ (0°C en la semana anterior). La distribución de la ATSM (**Figura 1b, panel derecho**) mantuvo la cobertura de los focos positivos ($+0,5^{\circ}\text{C}$) en la costa al norte de los 28°S y de valores neutros y algunos focos fríos hacia el sur. En el sector oceánico la condición fue neutra. En resumen, durante la semana 44, la costa de la **ZONA CENTRO-NORTE** presentó una condición cálida en la subzona norte y neutra en la subzona sur.

En la **ZONA CENTRO-SUR (Figura 1c)**, durante la semana 44 se mantuvo la condición de las tres semanas anteriores (**Figura 3**), neutra en la subzona norte con una ATSM semanal de $-0,4^{\circ}\text{C}$ ($-0,2^{\circ}\text{C}$ en la semana anterior), mientras que, en la subzona sur se mantuvo cálida con un promedio semanal de $+0,7^{\circ}\text{C}$ ($+0,7^{\circ}\text{C}$ en la semana anterior). El mapa de distribución de ATSM (**Figura 1c, panel**

derecho) mostró en la costa al norte de los 37°S focos de valores neutros y negativos (-0,5°C, de menor extensión), mientras que al sur de los 37°S se mantuvieron e intensificaron los focos positivos (+0,5°C a +1°C) y en el sector oceánico aumentó la cobertura e intensidad de focos positivos al sur de los 34°S. En resumen, durante la semana 44, la costa de la **ZONA CENTRO-SUR** presentó una condición neutra con tendencia negativa en la subzona norte y cálida en la subzona sur.

En la **ZONA SUR (Figura 1d)**, durante la semana 44, la condición oceanográfica cambió de neutra a cálida (**Figura 3**), con un promedio de ATSM semanal de +0,9°C en la subzona norte (+0,3°C en la semana anterior), y +0,7°C en la subzona sur (+0,2 en la semana anterior). El mapa de distribución de ATSM (**Figura 1d, panel derecho**) mostró un predominio de ATSM positivas en toda la zona (+0,5°C a +1°C). En resumen, en la semana 44 la **ZONA SUR** tuvo una condición cálida.

Evolución en las últimas 20 semanas (Figura 3):

Durante el período analizado (junio a octubre de 2025), la zona costera del país ha fluctuado con cambios entre cálido y neutro.

ZONA NORTE: La condición en la **subzona norte** y la **subzona sur** transitó de cálida a comienzos de junio a neutra hasta julio, volviendo a cálida desde la cuarta semana de julio hasta la cuarta semana de agosto cuando retrocedió a neutra, volviendo a una condición cálida desde fines de septiembre y neutra a mediados de octubre finalizando el mes cálido.

ZONA CENTRO NORTE: En la **subzona norte** y la **subzona sur** predominaron condiciones neutras hasta finales de julio y cálidas durante la mayor parte de agosto a septiembre, mientras que en octubre la condición estuvo cálida en la subzona norte y neutra en la subzona sur.

ZONA CENTRO-SUR: La **subzona norte** y la **subzona sur** presentaron una condición neutra hasta julio, cálida en agosto, volviendo a neutra desde la cuarta semana de agosto, quedando inestable entre septiembre-octubre: cálido-neutro en la subzona norte y neutro-cálido en la subzona sur.

ZONA SUR: Manifestó una menor variación respecto de las otras zonas, con un predominio de condiciones neutras en las últimas 20 semanas, y con tendencia cálida desde julio.




Figura 1. Series de tiempo diarias del promedio de la ATSM registrada en las primeras 20 mn de distancia a la costa (paneles izquierdos), de la ZONA NORTE (a), CENTRO-NORTE (b), CENTRO-SUR (c) y SUR (d) de Chile. Cada zona fue dividida en una subzona norte (línea naranja) y subzona sur (línea verde). Se incluye el valor promedio de ATSM semanal de cada subzona (texto con el color respectivo). La línea negra es la serie promedio mensual de ATSM de la región Niño 1+2 y la línea con círculos corresponde a ATSM de la región Niño 3.4. El panel derecho (mapa) muestra la distribución espacial de la ATSM promedio de la semana 44. La línea negra horizontal divide la zona en la subzona norte y sur. La línea negra punteada paralela a la costa, indica en los mapas las primeras 20 mn, área de donde se obtiene el valor de ATSM promedio diario y semanal, excepto en el área del mar interior ya que se utiliza el área del recuadro azul (d). La información de ATSM fue extraída del producto MUR, calculadas en base a la climatología de TSM satelital del periodo 2002 – 2025, provenientes de la plataforma SAPO-Chile (IFOP).




Figura 2. ATSM océano Pacífico- costa sudamericana del 4 de noviembre de 2025. La información de ATSM fue extraída del producto MUR, calculadas en base a la climatología de TSM satelital del periodo 2002 – 2025, provenientes de la plataforma SAPO-Chile (IFOP).




Figura 3. Desarrollo de las condiciones oceanográficas superficiales semanales de la ATSM por subzona (norte y sur) en la ZONA: NORTE, CENTRO-NORTE, CENTRO-SUR Y ZONA SUR de Chile en el periodo de las últimas 20 semanas (entre la semana 25: tercera semana de junio y la semana 44: quinta semana de octubre de 2025).

Referencias

NOAA, 2025. El Niño/Oscilación del sur (ENOS), discusión diagnóstica. 9 de octubre de 2025.
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensodisc/oct2025/ensodisc_Sp.pdf

SAPO. Sistema de Alerta, Predicción y Observación. <https://sapo.ifop.cl/>