



## REPORTES PERIODICOS

# PROGRAMA MANEJO Y MONITOREO DE LAS MAREAS ROJAS EN LAS REGIONES DE LOS LAGOS AYSÉN Y MAGALLANES


## ALTA FRECUENCIA (AF)

### Contenido

1. Estado de la abundancia relativa (AR) de la especie *Alexandrium catenella*, datos oceanográficos asociados y estado de alerta para la zona de muestreos de alta frecuencia (AF).
2. Imágenes satelitales de la temperatura superficial del mar (TSM), correspondiente a un día dentro del periodo de estudio.



INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO – DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA  
CENTRO DE ESTUDIOS DE ALGAS NOCIVAS (CREAN)  
ESTADO FLORACIONES ALGAS NOCIVAS, MUESTREO ALTA FRECUENCIA REPORTE 048 (29 abr - 04 may 2018)



Niveles de Abundancia relativa

- Sin Muestra
- Ausente
- Raro
- Escaso
- Regular
- Abundante
- Muy Abundante
- Extremadamente Abundante
- Hiper Abundante
- Ultra Abundante
- Mega Abundante

Alerta	Temperatura	Salinidad	Clorofila
	10,0 (± 0,06)	30,7 (±0,98)	1,5 (± 0,10)
Fitoplancton dominado por <i>Asterionellopsis glacialis</i> , <i>Thalassiosira</i> spp., <i>T. rotula</i> , <i>P. pseudodelicatissima</i> , <i>Tripos lineatum</i> , <i>Cerataulina pelagica</i> , <i>Dinophysis</i> spp.			

Alerta	Temperatura	Salinidad	Clorofila
	9,8 (± 0,05)	31,5 (±0,87)	1,3 (± 0,17)
Fitoplancton dominado por <i>Thalassiosira</i> spp., <i>Rhizosolenia cf. pungens</i> , <i>P. pseudodelicatissima</i> , <i>Skeletonema</i> spp., <i>Cerataulina pelagica</i> .			

Alerta	Temperatura	Salinidad	Clorofila
	9,5 (± 0,04)	32,4 (±0,57)	1,2 (± 0,05)
Fitoplancton dominado por <i>Thalassiosira</i> spp., <i>Rhizosolenia cf. pungens</i> , <i>P. pseudodelicatissima</i> , <i>Skeletonema</i> spp., <i>Cerataulina pelagica</i> .			

ESTADO DE LA ABUNDANCIA RELATIVA (AR) PARA *Alexandrium catenella*

Periodo: 29 abril al 04 mayo 2018

Los estimadores de AR se han mantenido bajos en la mayoría de las estaciones de muestreo. En el sector de Chiloé sur se observan valores de AR que van desde 0 (ausente) a 1 (raro). Para las estaciones ubicadas en la zona de Melinka, los valores de AR también son bajos con llegando solo hasta nivel 3 (regular). Para el sector de Raúl Marín Balmaceda, los estimadores de AR indican la ausencia de la microalga en todo el sector (nivel 0, ausente). Debido a que los estimadores de AR siguen con niveles bajos en la mayoría de las estaciones de muestreo, se mantiene el estado de **SITUACIÓN NORMAL** del reporte anterior para todas las zonas.

Niveles de Alerta indicados por el cuadro

- 
 Situación Normal
- 
 Precaución Moderada
- 
 Alerta Temprana
- 
 Situación de Riesgo

ESTADÍSTICAS DE VARIABLES OCEANOGRÁFICAS

Los valores promedio (± error estándar) para los parámetros oceanográficos de temperatura (°C), salinidad (psu) y clorofila-a (mg m<sup>-3</sup>), son normales para el periodo del año, con temperaturas promedio de 9,5 (± 0,04) °C valores inferiores a los registrados en el mismo periodo del año anterior (10,7) °C, salinidad normal (32,4 psu), y clorofila-a de 1,2 mg m<sup>-3</sup>.




Imagen satelital de la temperatura superficial del mar (TSM) para un día dentro del periodo de muestreo correspondiente a los últimos tres cruceros realizados. Los valores observados para el área de estudio similares a los valores medidos en terreno (ver recuadro página anterior), observándose en la imagen satelital valores entre 9 – 11 °C. El valor máximo superficial de temperatura medido en terreno es de 10,2 °C en la estación L22 – Bahía Asasao (sur de Chiloé), valor normal para la zona en esta época del año.