



MONITOREO REPRODUCTIVO SEMANA N° 29

(Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta)
(18 al 24 julio 2022)

Convenio de Desempeño 2022

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Norte

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Julio 2022

REQUIRENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Jefe Subsecretario de Economía y EMT

Javiera Petersen Muga

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Director Ejecutivo

Gonzalo Pereira Puchy

Jefe División Investigación Pesquera

Sergio Lillo Vega

JEFA PROYECTO

Carola Hernández Santoro

AUTOR

Eduardo Díaz Ramos

Laboratorio Biol. Reproductiva -Iquique



Monitoreo reproductivo de anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento macrosc3pico (mediante el IGS) y microsc3pico (mediante el IHA, IAD e IAO) de la evoluci3n semanal del proceso de maduraci3n gonadal y de desove de anchoveta en la zona norte. A partir de la semana 22 (30 mayo al 5 junio, 2022) se da inicio al monitoreo reproductivo intensivo entre las regiones de Arica - Parinacota y Antofagasta.

En la Semana 29, el an3lisis histol3gico se sustent3 de 293 hembras (10 muestreos), las que se recolectaron en las tres zonas de estudio, a partir de muestreos de la actividad artesanal e industrial (**Tabla 1, Figura 1**). Los tama1os fluctuaron en la zona de Arica entre 12,0 y 14,0 cm (moda 13,0 cm), en la zona de Iquique entre 11,0 y 16,5 cm (moda 14,5 cm; 2% bajo 12,0 cm) y en la zona de Antofagasta entre 12,0 y 17,0 cm (moda 14,0 cm).




Figura 1 Procedencia de anchoveta para el an3lisis de la condici3n reproductiva, semana 29.

Tabla 1
Resumen de muestreos de anchoveta por zonas, semana 29.

Semana	Fecha	Actividad	Zona	Muestreo	Latitud	Longitud	Amplitud talla (cm)	Moda (cm)	
29	18/07 - 24/07	Comercial	Arica (18°21' - 19°30')	Tierra	18°28'	70°22'	12,5 - 14,0	13,0-13,5	*
				Tierra	18°28'	70°22'	12,0 - 14,0	13,0	*
				Tierra	18°28'	70°23'	12,0 - 14,0	12,5	*
			Iquique (19°30' - 21°30')	Abordo	20°43'	70°27'	11,5 - 16,0	15,0	**
				Abordo	20°44'	70°32'	11,0 - 16,0	13,5	**
				Abordo	20°59'	70°23'	13,0 - 16,5	14,5	**
				Abordo	21°26'	70°24'	12,5 - 16,5	15,5	**
				Abordo	21°26'	70°25'	12,5 - 16,0	14,5	**
			Antofagasta (21°30' - 24°00')	Abordo	21°41'	70°34'	12,0 - 17,0	13,0	**
				Abordo	21°44'	70°37'	12,0 - 16,0	14,0	**

*: flota artesanal; **: flota industrial



Indicadores reproductivos

Los indicadores reflejaron niveles de máxima actividad ovárica ($IGS \geq 6\%$; IHA), no obstante, la intensidad de desove se mantiene baja, con un gradual incremento (IAD). Por su parte, la incidencia de atresia (IAO) fue nula (Tabla 2; Figura 2). La condición ovárica fue similar entre zonas, sin embargo, se destaca ejemplares de mayor tamaño modal en muestreos de la actividad industrial.

Tabla 2
Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta.

Anchoveta de la zona norte											
Semana	Fecha	Macroscópico		Microscópico		Proporción (%) tamaños (cm)					
(N°)	2022	IGS	n	IHA	IAD	IAO	n	≤ 11,5	12,0-13,5	14,0-15,5	≥ 16,0
22	30/05 - 05/06	4,2	557	67,6	14,5	7,4	296	5	58	36	1
23	06/06 - 12/06	3,4	754	71,6	5,6	5,9	324	8	66	25	1
24	13/06 - 19/06	3,6	514	86,5	6,5	1,5	325	5	60	35	0
25	20/06 - 26/06	3,7	341	83,5	4,5	4,5	309	11	70	19	0
26	27/06 - 03/07	5,1	397	89,8	6,9	1,6	305	8	76	16	0
27	04/07 - 10/07	5,5	548	93,5	11,1	2,6	306	2	58	34	6
28	11/07 - 17/07	6,3	391	98,3	9,3	1,3	300	5	39	34	22
29	18/07 - 24/07	6,7	444	99,7	14,0	0,0	293	1	49	45	5




Figura 2 Indicadores reproductivos: a) índice gonadosomático; b) hembras activas; c) índice de actividad de desove; d) índice de atresia ovárica. Los puntos blancos indican los años respectivos (2021 y 2022), y las líneas segmentadas señalan los umbrales 5%, 90% y 25% para IGS, IHA e IAD, respectivamente.



Consideración final

La anchoveta se encuentra en proceso de maduración gonadal, alcanzando el umbral de máxima actividad ovárica ($IGS \geq 6\%$), mientras que, el indicador de desove permanece bajo, con un gradual incremento.

De acuerdo a los antecedentes, la anchoveta en la zona norte se encuentra en desarrollo del evento reproductivo, en niveles de máxima actividad ovárica, pero se mantiene con baja intensidad de desove.

Glosario:

Índice gonadosomático (IGS): indicador de actividad que cuantifica los cambios del peso del ovario producto del desarrollo de los ovocitos.

Índice de hembras activas (IHA): indicador de actividad (histológico), como una proporción de hembras que evidencian algún grado de desarrollo de ovocitos, sin atresia masiva.

Índice de actividad de desove (IAD): indicador de la intensidad de desove (histológico), como una proporción de hembras que presentan ovocitos hidratados y/o folículos postovulatorios de estadios I-IV (hembras desovantes en la misma noche y/o una noche anterior a la captura).

Índice de atresia ovárica (IAO): indicador de atresia ovocitaria masiva ($>50\%$), que refleja la finalización del evento reproductivo o algún factor perturbador del proceso de maduración gonadal y del desove.