



MONITOREO REPRODUCTIVO SEMANA N° 1

(Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta)
(2 al 8 enero 2023)

Convenio de Desempeño 2022

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Norte

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Enero 2023

REQUIRENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Jefe Subsecretario de Economía y EMT

Javiera Petersen Muga

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Director Ejecutivo

Gonzalo Pereira Puchy

Jefe División Investigación Pesquera

Carlos Montenegro Silva

JEFA PROYECTO

Carola Hernández Santoro

AUTOR

Eduardo Díaz Ramos

Laboratorio Biol. Reproductiva -Iquique



Monitoreo reproductivo de anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento macroscópico (mediante el IGS) y microscópico (mediante el IHA, IAD e IAO) de la evolución semanal del proceso de maduración gonadal y de desove de anchoveta en la zona norte. A partir de la semana 22 (30 mayo al 5 junio, 2022) se da inicio al monitoreo reproductivo intensivo entre las regiones de Arica - Parinacota y Antofagasta.

En la Semana 1, el análisis histológico se sustentó de 179 hembras (4 muestreos), las que se recolectaron en la zona de Arica, a partir de muestreos de la actividad artesanal (**Tabla 1, Figura 1**). Los tamaños fluctuaron en la zona de Arica entre 11,0 y 14,0 cm (moda 12,5 cm; 7% bajo 12,0 cm). En Iquique, sin desembarque del recurso. En Mejillones, el desembarque artesanal no presentó una condición que permitiera la toma de datos morfométricos.




Figura 1 Procedencia de anchoveta para el análisis de la condición reproductiva, semana 1.



Tabla 1
Muestreos para el análisis de la condición de desove de anchoveta, semana 1.

Semana	Fecha	Actividad	Zona	Muestreo	Latitud	Longitud	Amplitud talla (cm)	Moda (cm)	
1	02/01 - 08/01	Comercial	Arica (18°21' - 19°30')	Abordo	18°25'	70°22'	12,0 - 13,5	12,5	*
				Abordo	18°28'	70°23'	11,5 - 13,0	12,0	*
				Tierra	18°28'	70°23'	11,5 - 13,5	12,5	*
				Tierra	18°28'	70°23'	11,0 - 14,0	12,5	*
			Iquique (19°30' - 21°30')						
			Antofagasta (21°30' - 24°00')						

*: flota artesanal; **: flota industrial

Indicadores reproductivos

Según los indicadores, se mantiene el desarrollo gonadal (IHA/IGS), no obstante, con baja intensidad de desove (IAD) (Tabla 2; Figura 2).

Tabla 2
Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta.

Anchoveta de la zona norte											
Semana (N°)	Fecha	Macroscópico IGS	n	IHA	IAD	IAO	n	Proporción (%) tamaños (cm)			
	2022-2023							≤ 11,5	12,0-13,5	14,0-15,5	≥ 16,0
22	30/05 - 05/06	4,2	557	67,6	14,5	7,4	296	5	58	36	1
23	06/06 - 12/06	3,4	754	71,6	5,6	5,9	324	8	66	25	1
24	13/06 - 19/06	3,6	514	86,5	6,5	1,5	325	5	60	35	0
25	20/06 - 26/06	3,7	341	83,5	4,5	4,5	309	11	70	19	0
26	27/06 - 03/07	5,1	397	89,8	6,9	1,6	305	8	76	16	0
27	04/07 - 10/07	5,5	548	93,5	11,1	2,6	306	2	58	34	6
28	11/07 - 17/07	6,3	391	98,3	9,3	1,3	300	5	39	34	22
29	18/07 - 24/07	6,7	444	99,7	14,0	0,0	293	1	49	45	5
30	25/07 - 31/07	6,7	328	98,4	29,3	0,7	304	7	56	31	6
31	01/08 - 07/08	6,4	658	99,4	31,1	0,6	312	2	66	31	1
32	08/08 - 14/08	6,2	207	96,3	37,0	3,2	216	14	77	9	0
33	15/08 - 21/08	*									
34	22/08 - 28/08	*									
35	29/08 - 04/09	*									
36	05/09 - 11/09	*									
37	12/09 - 18/09	*									
38	19/09 - 25/09	6,1	260	92,6	36,9	6,1	312	29	64	7	0
39	26/09 - 02/10	5,6	540	97,8	31,9	1,5	411	22	67	11	0,3
40	03/10 - 09/10	5,8	505	98,8	28,7	1,2	321	14	72	14	0
41	10/10 - 16/10	5,7	371	95,1	35,2	2,3	307	10	68	21	1
42	17/10 - 23/10	5,9	78	100	40,0	0,0	195	0	37	60	3
43	24/10 - 30/10	*									
44	31/10 - 06/11	5,1	284	95,0	19,1	4,6	282	3	61	33	3
45	07/11 - 13/11	4,8	207	93,0	16,9	7,0	213	3	69	28	0
46	14/11 - 20/11	5,0	386	89,6	7,1	10,4	309	3	62	34	1
47	21/11 - 27/11	5,5	546	86,9	4,0	13,1	251	3	69	27	1
48	28/11 - 04/12	5,1	362	88,4	12,1	11,2	232	6	67	26	1
49	05/12 - 11/12	5,7	454	93,9	5,2	6,1	213	6	77	17	0
50	12/12 - 18/12	4,9	461	94,6	24,6	5,4	203	5	89	6	0,2
51	19/12 - 25/12	4,5	106	93,2	10,8	6,8	74	2	94	4	0
52	26/12 - 01/01	4,5	178	100	24,6	0,0	183	4	95	1	0
1	02/01 - 08/01	5,7	236	96,1	5,0	3,9	179	7	92	1	0

* Sin muestra por veda biológica




Figura 2 Indicadores reproductivos: a) índice gonadosomático; b) hembras activas; c) Índice de Actividad de Desove; d) Índice de Atresia Ovárica. Los puntos blancos indican los años respectivos (2021, 2022 y 2023), y las líneas segmentadas señalan los umbrales 5%, 90% y 25% para IGS, IHA e IAD, respectivamente.

Consideración final

La anchoveta en la zona de Arica se mantiene mayoritariamente con desarrollo gonadal (IHA). El IGS mostró un repunte, no obstante, el comportamiento del indicador en las últimas semanas muestra el descenso de la actividad ovárica. Por su parte, desde noviembre la tendencia del IAD con fluctuaciones bajo el umbral 25% refleja la disminución de la intensidad de los desoves, y el término del periodo de la máxima intensidad de desove ($MID \geq 25\%$), acorde al patrón histórico.

Glosario:

Índice gonadosomático (IGS): indicador de actividad que cuantifica los cambios del peso del ovario producto del desarrollo de los ovocitos.

Índice de hembras activas (IHA): indicador de actividad (histológico), como una proporción de hembras que evidencian algún grado de desarrollo de ovocitos, sin atresia masiva.

Índice de actividad de desove (IAD): indicador de la intensidad de desove (histológico), como una proporción de hembras que presentan ovocitos hidratados y/o folículos postovulatorios de estadios I-IV (hembras desovantes en la misma noche y/o una noche anterior a la captura).

Índice de atresia ovárica (IAO): indicador de atresia ovocitaria masiva ($>50\%$), que refleja la finalización del evento reproductivo o algún factor perturbador del proceso de maduración gonadal y del desove.