

2025

Boletín semanal N° 33

(11 al 17 de agosto del año 2025)

“Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la zona norte de Chile, entre la Región Arica -Parinacota y Coquimbo, año 2024”.

Subsecretaría Economía y EMT
agosto, 2025.



Boletín semanal N° 33

(11 al 17 de agosto del año 2025)

Convenio de Desempeño 2023
“Programa de seguimiento de las principales pesquerías
pelágicas de la zona norte de Chile, entre la Región Arica
– Parinacota y Coquimbo, año 2024.”
Subsecretaría de Economía y EMT / agosto 2025.

Requiente

**Subsecretaría de Economía y
Empresas de Menor Tamaño**

Subsecretaria de Economía y
Empresas de Menor Tamaño
Javiera Constanza Petersen Muga

Ejecutor

Instituto de Fomento Pesquero, IFOP

Director Ejecutivo
Gonzalo Pereira Puchy

Jefe División Investigación Pesquera
Carlos Montenegro Silva

Jefe de Proyecto
Carola Hernández Santoro

Autores

Biológico Pesquero

Carola Hernández Santoro
Ljubitzta Clavijo Gorostiaga

Oceanografía

Milena Pizarro Revello
Adrián Bustamante Maino



BOLETÍN SEMANAL BIOLÓGICO - PESQUERO N° 33

(REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A COQUIMBO, 11 al 17 de agosto, 2025)

Carola Hernández S. / Ljubitza Clavijo G.

carola.hernandez@ifop.cl / ljubitza.clavijo@ifop.cl

DESEMBARQUE DE PECES PELÁGICOS ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN¹

REGIONES ARICA-PARINACOTA, TARAPACÁ y ANTOFAGASTA

En la Semana 33 el desembarque total fue **15.921 t.**

11.094 t correspondieron a anchoveta	69,7 %
3.710 t a jurel	23,3 %
6 t a sardina española	0,0 %
1.053 t a caballa	6,6 %
58 t a otras especies	0,4 %

Al 17 de agosto el desembarque acumulado fue **414.586 t**
Cifra en 146 mil t mayor con respecto al 2024 y 255 mil t mayor con respecto al 2023.

Tabla 1 Desembarque de naves de cerco, acumulado a la fecha. Regiones AyP, TPCA y ANTOF (2025, 2024 y 2023).

ACUMULADO	2025		2024		2023		2025 en 2024	2025 en 2023
	t	%	t	%	t	%	% de variación	% de variación
Anchoveta	235.913	56,9	98.534	36,8	49.371	31,0	139 % mayor	378 % mayor
Jurel	112.512	27,1	105.750	39,4	76.777	48,2	6 % mayor	47 % mayor
Sardina	7.690	1,9	5.413	2,0	2.525	1,6	42 % mayor	205 % mayor
Caballa	57.980	14,0	58.148	21,7	27.234	17,1	0 % menor	113 % mayor
Otros	491	0,1	271	0,1	3.299	2,1	81 % mayor	85 % menor
Total	414.586	100	268.116	100	159.206	100	55 % mayor	160 % mayor

Tabla 2 Desembarque cerquero, acumulado al mes y a la fecha. Regiones AyP, TPCA y ANTOF (2016 a 2025).

Acumulado	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Agosto	17.080	11.746	41.965	17.212	16.465	0	34.261	282	6.970	38.140
A la fecha	216.108	477.529	526.642	443.093	302.944	330.177	431.119	159.206	268.116	414.586
En el año	263.258	605.478	758.201	582.344	390.865	492.843	584.343	253.967	376.742	414.586


Tabla 3 Desembarque por Puerto en la Semana y acumulado a la fecha. Regiones AyP, TPCA y ANTOF, 2025.

Puerto	Semana 33		Acumulado en el 2025	
	t	%	t	%
Arica	9.474	59,5	154.090	37,2
Iquique	6.447	40,5	187.990	45,3
Mejillones	0	0,0	72.506	17,5
Total	15.921	100	414.586	100

¹ La información biológico – pesquera que se entrega en este boletín corresponde a resultados preliminares de la pesquería.



DESEMBARQUE ORIENTADO A LA INDUSTRIA DE REDUCCIÓN REGIONES ARICA Y PARINACOTA A ANTOFAGASTA, 2016 – 2025 SEMANA 33 (11 AL 17 DE AGOSTO, 2025)






ASPECTOS BIOLÓGICOS RELEVANTES DE LOS PECES PELÁGICOS

- ✓ **Anchoveta** *Engraulis ringens*. Se analizaron las tallas de **3.377** provenientes de la pesca artesanal en las zonas de Arica (94,5 %) y de la zona de Iquique (5,5 %). La distribución de tallas presentó una estructura unimodal, con ejemplares que oscilaron entre 7,5 y 16,5 cm. Se identificó una moda principal en los 12,0 cm, que representan el 29,0 del total de la muestra.
- ✓ **Jurel** *Trachurus murphyi*. Se analizaron las tallas de **282 ejemplares** provenientes de la pesca industrial en las zonas de Iquique. La distribución de tallas presentó una estructura multimodal, con individuos entre 25 y 51 cm. Se identificaron dos modas principales en los 35 y 45 cm, las cuales representaron un 11,0% y 9,2% respectivamente, del total de los ejemplares muestreados.
- ✓ **Caballa** *Scomber japonicus*. Sin registro.
- ✓ **Sardina española** *Sardinops sagax*. Sin registro.



SEMANA 33 (11 AL 17 DE AGOSTO, 2025)
REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA – ANTOFAGASTA





REGIÓN ATACAMA

En la Semana 33 el desembarque total fue **0 t.**

0 t reportadas de anchoveta	0,0 %
0 t de jurel	0,0 %
0 t de sardina española	0,0 %
0 t de caballa	0,0 %
0 t de otras especies	0,0 %

Al 17 de agosto el desembarque acumulado fue **15.542 t**
Cifra en 22 mil t menor que el año 2024 y 3 mil t menor que el año 2023.

Tabla 1 Desembarque de naves de cerco, acumulado a la fecha. Región Atacama (2025, 2024 y 2023).

ACUMULADO	2025		2024		2023		2025 en 2024	2025 en 2023
Recursos	t	%	t	%	t	%	% de variación	% de variación
Anchoveta	0	0,0	0	0,0	1.050	5,6	% mayor	100 % menor
Jurel	13.245	85,2	17.742	47,7	10.090	54,3	25 % menor	31 % mayor
Sardina	540	3,5	1.290	3,5	591	3,2	58 % menor	9 % menor
Caballa	1.757	11,3	18.141	48,8	6.863	36,9	90 % menor	74 % menor
Otros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	% mayor	% mayor
Total	15.542	100	37.173	100	18.594	100	58 % menor	16 % menor

Tabla 2 Desembarque semanal acumulado en el mes y a la fecha. Región Atacama (2016 a 2025).


Acumulado	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Agosto	1.806	2.269	11	307	1.368	352	1.966	19	0	0
A la fecha	38.030	31.857	34.934	41.827	40.759	40.712	47.072	18.594	37.173	15.542
En el año	44.470	34.771	43.045	46.470	40.810	65.116	69.297	41.778	53.891	15.542

ASPECTOS BIOLÓGICOS RELEVANTES DE LOS PECES PELÁGICOS

- ✓ **Anchoveta** *Engraulis ringens*. Sin desembarque.
- ✓ **Jurel** *Trachurus murphyi*. Sin desembarque.
- ✓ **Caballa** *Scomber japonicus*. Sin desembarque.
- ✓ **Sardina española** *Sardinops sagax*. Sin desembarque
- ✓




DESEMBARQUE ORIENTADO A LA INDUSTRIA DE REDUCCIÓN REGIÓN ATACAMA, 2016 – 2025 SEMANA 33 (11 A 17 DE AGOSTO, 2025)





SEMANA 33 (11 AL 17 DE AGOSTO, 2025)
REGIÓN DE ATACAMA



**REGIÓN COQUIMBO**

En la Semana 33 el desembarque total fue **0 t.**

0 t de anchoveta	0,0 %
0 t de jurel	0,0 %
0 t de sardina española	0,0 %
0 t de caballa	0,0 %
0 t de otras especies	0,0 %

Al 17 de agosto el desembarque acumulado fue **29.462 t**
Cifra 3 mil t menor con respecto al 2024 y 10 mil t menor respecto al 2023.

Tabla 1 Desembarque de naves de cerco, acumulado a la fecha. Región Coquimbo (2024, 2023 y 2022).

ACUMULADO	2025		2024		2023		2025 en 2024	2025 en 2023
Recursos	t	%	t	%	t	%	% de variación	% de variación
Anchoveta	157	0,5	0	0,0	14.527	36,5	% mayor	99 % menor
Jurel	25.326	86,0	23.212	72,6	18.637	46,8	9 % mayor	36 % mayor
Sardina	205	0,7	724	2,3	259	0,7	72 % menor	21 % menor
Caballa	3.426	11,6	7.924	24,8	5.518	13,9	57 % menor	38 % menor
Otros	348	1,2	121	0,4	847	2,1	188 % mayor	59 % menor
Total	29.462	100	31.981	100	39.788	100	8 % menor	26 % menor

Tabla 2 Desembarque semanal, acumulado en el mes y a la fecha. Región Coquimbo (2014 a 2024).


Acumulado	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Agosto	857	406	0	0	1.865	286	0	0	0	0
A la fecha	22.490	23.585	18.553	28.130	36.812	40.460	39.319	39.788	31.981	29.462
En el año	24.043	26.543	18.553	29.403	38.356	41.166	45.952	49.519	42.385	29.462

ASPECTOS BIOLÓGICOS RELEVANTES DE LOS PECES PELÁGICOS

- ✓ **Anchoveta** *Engraulis ringens*. Sin desembarque.
- ✓ **Jurel** *Trachurus murphyi*. Sin desembarque.
- ✓ **Caballa** *Scomber japonicus*. Sin desembarque.
- ✓ **Sardina española** *Sardinops sagax*. Sin desembarque.




DESEMBARQUE ORIENTADO A LA INDUSTRIA DE REDUCCIÓN REGIÓN COQUIMBO, 2016 - 2025 SEMANA 33 (11 AL 17 DE AGOSTO, 2025)





SEMANA 33 (11 AL 17 DE AGOSTO, 2025)
REGIÓN DE COQUIMBO





CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS DE LA ZONA NORTE Y ZONA CENTRO NORTE, SEMANA 33 (11 AL 17 DE AGOSTO, 2025)

ESCALA REGIONAL:

En el boletín de agosto la NOAA cambió su estatus a **Vigilancia de La Niña**, la información de julio indicó que el Pacífico ecuatorial se mantuvo neutro con una probabilidad del 56% de que esta condición persista entre agosto y octubre, la misma probabilidad reportada el mes anterior (NOAA, 2025). La región Niño 1+2 (**Figura 1, Ecuador y norte de Perú**) presentó valores positivos de las ATSM entre febrero y julio, con valores que en su mayoría superaron el umbral para condición cálida ($>+0,5^{\circ}\text{C}$); la excepción fue mayo y julio, meses en que este índice descendió a valores neutros ($+0,1^{\circ}\text{C}$ y $0,4^{\circ}\text{C}$, respectivamente). En tanto, en la región Niño 3.4 (**Figura 1, Pacífico central**), los promedios mensuales de ATSM entre febrero y julio se mantuvieron en niveles neutros (en el rango inferior a $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$).

En la actual semana: La imagen correspondiente al 18 de agosto (**Figura 2**) muestra en la región ecuatorial un predominio de ATSM entre $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (condición neutra), con presencia de focos fríos y cálidos ($\pm 1^{\circ}\text{C}$) en la franja ecuatorial producto de un tren de ondas, con un foco de ATSM negativas cerca de la costa en Ecuador (-1°C) mientras que, el Pacífico sudamericano estuvo más cálido que la semana anterior, con focos de ATSM positivas ($+1^{\circ}\text{C}$) a lo largo de la costa desde el norte de Perú al sur de Chile.

EN RELACIÓN A LA CONDICIÓN SEMANAL DE LA COSTA CHILENA:

En la **ZONA NORTE (Figura 1a)**, durante la semana 33, la condición oceanográfica costera se mantuvo cálida, con ATSM promedio semanal de $+0,6^{\circ}\text{C}$ en la subzona norte y $+0,9^{\circ}\text{C}$ en la subzona sur (valores similares en la semana anterior, cálida). La distribución semanal de las ATSM (**Figura 1a, panel derecho**) mostró amplios focos de ATSM positivas ($>+0,5^{\circ}\text{C}$) repartidos en toda la zona. En el sector oceánico, la mayor presencia de anomalías cálidas se observó en la subzona norte. En resumen, durante la semana 33, la costa de la **ZONA NORTE** presentó una condición cálida.

En la **ZONA CENTRO-NORTE (Figura 1b)**, durante la semana 33 se mantuvo la condición cálida en la costa, con un valor de ATSM promedio semanal de $+0,8^{\circ}\text{C}$ en la subzona norte ($+0,5^{\circ}\text{C}$ la semana anterior) y de $+0,9^{\circ}\text{C}$ en la subzona sur ($+0,9^{\circ}\text{C}$ en la semana anterior). La distribución de la ATSM (**Figura 1b, panel derecho**) mostró un amplio predominio de valores positivos ($+0,5^{\circ}\text{C}$ a $+1^{\circ}\text{C}$) tanto en la costa como en el sector oceánico. En resumen, durante la semana 33, la costa de la **ZONA CENTRO-NORTE** presentó una condición cálida.

Evolución en las últimas 20 semanas (Figura 3):

Durante el período analizado (abril a agosto de 2025), en la zona costera del país se observan transiciones progresivas, predominando condiciones neutras desde la semana 25 en todas las zonas, con una tendencia a condiciones cálidas desde Arica hasta los 40°S en las dos últimas semanas (semana 32 y 33).

ZONA NORTE: La condición en la **subzona norte** se mantuvo fría hasta la tercera semana de abril. Posteriormente, transitó a cálida en la segunda semana de mayo, y pasó a neutra desde la tercera semana de junio. Desde la cuarta semana de julio la condición ha estado principalmente cálida. En contraste, en la

subzona sur desde la segunda semana de abril predominó una condición cálida, la que pasó a neutra desde la tercera semana de junio, volviendo a cálida desde la última semana de julio.

ZONA CENTRO NORTE: En la **subzona norte** y la **subzona sur** predominaron condiciones neutras. Condición fría sólo se observó a comienzos de abril y cálida a inicio de junio y desde inicio de agosto.




Figura 1. Series de tiempo diarias del promedio de la ATSM registrada en las primeras 20 mn de distancia a la costa (paneles izquierdos), de la ZONA NORTE (a) y CENTRO-NORTE (b) de Chile. Cada zona fue dividida en una subzona norte (línea naranja) y subzona sur (línea verde). Se incluye el valor promedio de ATSM semanal de cada subzona (texto con el color respectivo). La línea negra es la serie promedio mensual de ATSM de la región Niño 1+2 y la línea con círculos corresponde a ATSM de la región Niño 3.4. El panel derecho (mapa) muestra la distribución espacial de la ATSM promedio de la semana 33. La línea negra horizontal divide la zona en la subzona norte y sur. La línea negra punteada paralela a la costa, indica en los mapas las primeras 20 mn, área de donde se obtiene el valor de ATSM promedio diario y semanal. La información de ATSM fue extraída del producto MUR, calculadas en base a la climatología de TSM satelital del periodo 2002 – 2025, provenientes de la plataforma SAPO-Chile (IFOP).




Figura 2. ATSM océano Pacífico- costa sudamericana del 18 de agosto de 2025. La información de ATSM fue extraída del producto MUR, calculadas en base a la climatología de TSM satelital del periodo 2002 – 2025, provenientes de la plataforma SAPO-Chile (IFOP).




Figura 3. Desarrollo de las condiciones oceanográficas superficiales semanales de la ATSM por subzona (norte y sur) en la ZONA: NORTE y CENTRO-NORTE de Chile en el periodo de las últimas 22 semanas (entre la semana 13: cuarta semana de marzo y la semana 32: primera semana de agosto de 2025).

Referencias

NOAA, 2025. El Niño/Oscilación del sur (ENOS), discusión diagnóstica. 14 de agosto de 2025.
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_disc_aug2025/ensodisc_Sp.pdf

SAPO. Sistema de Alerta, Predicción y Observación.
<https://sapo.ifop.cl/>