

2025

Boletín semanal N° 35

(25 al 31 de agosto del año 2025)

“Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Pelágicas de la zona norte de Chile, entre la Región Arica -Parinacota y Coquimbo, año 2025”.

Subsecretaría Economía y EMT
septiembre, 2025.



Boletín semanal N° 35

(25 al 31 de agosto del año 2025)

Convenio de Desempeño 2023
“Programa de seguimiento de las principales pesquerías
pelágicas de la zona norte de Chile, entre la Región Arica
– Parinacota y Coquimbo, año 2025.”
Subsecretaría de Economía y EMT / septiembre 2025.

Requiente

**Subsecretaría de Economía y
Empresas de Menor Tamaño**

Subsecretaria de Economía y
Empresas de Menor Tamaño
Javiera Constanza Petersen Muga

Ejecutor

Instituto de Fomento Pesquero, IFOP

Director Ejecutivo
Gonzalo Pereira Puchy

Jefe División Investigación Pesquera
Carlos Montenegro Silva

Jefe de Proyecto
Carola Hernández Santoro

Autores

Biológico Pesquero

Carola Hernández Santoro
Ljubitzta Clavijo Gorostiaga

Oceanografía

Milena Pizarro Revello
Adrián Bustamante Maino



BOLETÍN SEMANAL BIOLÓGICO - PESQUERO N° 35

(REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A COQUIMBO, 25 al 31 de agosto, 2025)

Carola Hernández S. / Ljubitza Clavijo G.

carola.hernandez@ifop.cl / ljubitza.clavijo@ifop.cl

DESEMBARQUE DE PECES PELÁGICOS ORIENTADOS A LA REDUCCIÓN¹

REGIONES ARICA-PARINACOTA, TARAPACÁ y ANTOFAGASTA

En la Semana 35 el desembarque total fue **1.258 t.**

0 t correspondieron a anchoveta	0,0 %
1.256 t a jurel	99,8 %
0 t a sardina española	0,0 %
0 t a caballa	0,0 %
2 t a otras especies	0,2 %

Al 31 de agosto el desembarque acumulado fue **424.070 t**
Cifra en 156 mil t mayor con respecto al 2024 y 264 mil t mayor con respecto al 2023.

Tabla 1 Desembarque de naves de cerco, acumulado a la fecha. Regiones AyP, TPCA y ANTOF (2025, 2024 y 2023).

ACUMULADO	2025		2024		2023		2025 en 2024	2025 en 2023
	t	%	t	%	t	%	% de variación	% de variación
Anchoveta	239.839	56,6	98.534	36,8	50.461	31,5	143 % mayor	375 % mayor
Jurel	115.990	27,4	105.750	39,4	76.777	47,9	10 % mayor	51 % mayor
Sardina	9.351	2,2	5.413	2,0	2.525	1,6	73 % mayor	270 % mayor
Caballa	58.278	13,7	58.148	21,7	27.234	17,0	0 % mayor	114 % mayor
Otros	612	0,1	271	0,1	3.300	2,1	126 % mayor	81 % menor
Total	424.070	100	268.116	100	160.297	100	58 % mayor	165 % mayor

Tabla 2 Desembarque cerquero, acumulado al mes y a la fecha. Regiones AyP, TPCA y ANTOF (2016 a 2025).

Acumulado	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Agosto	17.080	15.239	50.778	20.018	25.524	0	34.853	1.373	6.970	46.366
A la fecha	216.108	481.022	535.455	445.899	312.578	330.177	431.982	160.297	268.116	424.070
En el año	263.258	605.478	758.201	582.344	390.865	492.843	584.343	253.967	376.742	424.070


Tabla 3 Desembarque por Puerto en la Semana y acumulado a la fecha. Regiones AyP, TPCA y ANTOF, 2025.

Puerto	Semana 35		Acumulado en el 2025	
	t	%	t	%
Arica	0	0,0	157.434	37,1
Iquique	1.258	100,0	191.305	45,1
Mejillones	0	0,0	75.331	17,8
Total	1.258	100	424.070	100

¹ La información biológico – pesquera que se entrega en este boletín corresponde a resultados preliminares de la pesquería.



DESEMBARQUE ORIENTADO A LA INDUSTRIA DE REDUCCIÓN REGIONES ARICA Y PARINACOTA A ANTOFAGASTA, 2016 – 2025 SEMANA 35 (25 AL 31 DE AGOSTO, 2025)






ASPECTOS BIOLÓGICOS RELEVANTES DE LOS PECES PELÁGICOS

- ✓ **Anchoveta** *Engraulis ringens*. Sin desembarque.
- ✓ **Jurel** *Trachurus murphyi*. Se analizaron las tallas de **467 ejemplares** provenientes de la pesca industrial en las zonas de Iquique. La distribución de tallas presentó una estructura unimodal, con individuos entre 38 y 58 cm. Se identificó una moda principal en los 45 cm, que representa el 19,1% del total de los ejemplares muestreados.
- ✓ **Caballa** *Scomber japonicus*. Sin desembarque.
- ✓ **Sardina española** *Sardinops sagax*. Sin desembarque.



SEMANA 35 (25 AL 31 DE AGOSTO, 2025)
REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA – ANTOFAGASTA





REGIÓN ATACAMA

En la Semana 35 el desembarque total fue **0 t.**

0 t reportadas de anchoveta	0,0 %
0 t de jurel	0,0 %
0 t de sardina española	0,0 %
0 t de caballa	0,0 %
0 t de otras especies	0,0 %

Al 31 de agosto el desembarque acumulado fue **15.542 t**
Cifra en 22 mil t menor que el año 2024 y 3 mil t menor que el año 2023.

Tabla 1 Desembarque de naves de cerco, acumulado a la fecha. Región Atacama (2025, 2024 y 2023).

ACUMULADO	2025		2024		2023		2025 en 2024	2025 en 2023
Recursos	t	%	t	%	t	%	% de variación	% de variación
Anchoveta	0	0,0	0	0,0	1.050	5,6	% mayor	100 % menor
Jurel	13.245	85,2	17.742	47,7	10.090	54,3	25 % menor	31 % mayor
Sardina	540	3,5	1.290	3,5	591	3,2	58 % menor	9 % menor
Caballa	1.757	11,3	18.141	48,8	6.863	36,9	90 % menor	74 % menor
Otros	0	0,0	0	0,0	0	0,0	% mayor	% mayor
Total	15.542	100	37.173	100	18.594	100	58 % menor	16 % menor


Tabla 2 Desembarque semanal acumulado en el mes y a la fecha. Región Atacama (2016 a 2025).

Acumulado	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Agosto	1.806	2.779	11	1.470	1.368	352	1.966	19	0	0
A la fecha	38.030	32.367	37.090	43.336	40.759	40.712	47.072	18.594	37.173	15.542
En el año	44.470	34.771	43.045	46.470	40.810	65.116	69.297	41.778	53.891	15.542

ASPECTOS BIOLÓGICOS RELEVANTES DE LOS PECES PELÁGICOS


- ✓ **Anchoveta** *Engraulis ringens*. Sin desembarque.
- ✓ **Jurel** *Trachurus murphyi*. Sin desembarque.
- ✓ **Caballa** *Scomber japonicus*. Sin desembarque.
- ✓ **Sardina española** *Sardinops sagax*. Sin desembarque
- ✓

DESEMBARQUE ORIENTADO A LA INDUSTRIA DE REDUCCIÓN REGIÓN ATACAMA, 2016 – 2025 SEMANA 35 (25 A 31 DE AGOSTO, 2025)





SEMANA 35 (25 AL 31 DE AGOSTO, 2025)
REGIÓN DE ATACAMA



**REGIÓN COQUIMBO**

En la Semana 35 el desembarque total fue **0 t.**

0 t de anchoveta 0,0 %
0 t de jurel 0,0 %
0 t de sardina española 0,0 %
0 t de caballa 0,0 %
0 t de otras especies 0,0 %

Al 31 de agosto el desembarque acumulado fue **29.462 t**
Cifra 3 mil t menor con respecto al 2024 y 10 mil t menor respecto al 2023.

Tabla 1 Desembarque de naves de cerco, acumulado a la fecha. Región Coquimbo (2024, 2023 y 2022).

ACUMULADO	2025		2024		2023		2025 en 2024	2025 en 2023
Recursos	t	%	t	%	t	%	% de variación	% de variación
Anchoveta	157	0,5	0	0,0	14.527	36,5	% mayor	99 % menor
Jurel	25.326	86,0	23.212	72,6	18.637	46,8	9 % mayor	36 % mayor
Sardina	205	0,7	724	2,3	259	0,7	72 % menor	21 % menor
Caballa	3.426	11,6	7.924	24,8	5.518	13,9	57 % menor	38 % menor
Otros	348	1,2	121	0,4	847	2,1	188 % mayor	59 % menor
Total	29.462	100	31.981	100	39.788	100	8 % menor	26 % menor

Tabla 2 Desembarque semanal, acumulado en el mes y a la fecha. Región Coquimbo (2014 a 2024).


Acumulado	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Agosto	857	1.302	0	0	2.259	286	0	0	0	0
A la fecha	22.595	24.888	18.553	28.130	37.206	40.460	39.319	39.788	31.981	29.462
En el año	24.043	26.543	18.553	29.403	38.356	41.166	45.952	49.519	42.385	29.462

ASPECTOS BIOLÓGICOS RELEVANTES DE LOS PECES PELÁGICOS

- ✓ **Anchoveta** *Engraulis ringens*. Sin desembarque.
- ✓ **Jurel** *Trachurus murphyi*. Sin desembarque.
- ✓ **Caballa** *Scomber japonicus*. Sin desembarque.
- ✓ **Sardina española** *Sardinops sagax*. Sin desembarque.




DESEMBARQUE ORIENTADO A LA INDUSTRIA DE REDUCCIÓN REGIÓN COQUIMBO, 2016 - 2025 SEMANA 35 (25 AL 31 DE AGOSTO, 2025)





SEMANA 35 (25 AL 31 DE AGOSTO, 2025)
REGIÓN DE COQUIMBO





CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS DE LA ZONA NORTE Y ZONA CENTRO NORTE, SEMANA 35 (25 AL 31 DE AGOSTO, 2025)

ESCALA REGIONAL:

En su boletín de agosto, la NOAA cambió el estatus de **Inactivo** a **Vigilancia de La Niña**, ya que hacia fines de 2025 aumentan las probabilidades del desarrollo de este evento. La información de julio indicó que el Pacífico ecuatorial se mantuvo neutro con una probabilidad del 56% de que esta condición persista entre agosto y octubre, la misma probabilidad reportada el mes anterior (NOAA, 2025). La región Niño 1+2 (**Figura 1, Ecuador y norte de Perú**) presentó valores positivos de las ATSM entre febrero y julio, con valores que en su mayoría superaron el umbral para condición cálida ($>+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$); la excepción fue mayo y julio, meses en que este índice descendió a valores neutros ($+0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$, respectivamente). En tanto, en la región Niño 3.4 (**Figura 1, Pacífico central**), los promedios mensuales de ATSM entre febrero y julio se mantuvieron en niveles neutros (en el rango inferior a $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$).

En la actual semana: La imagen correspondiente al 2 de septiembre (**Figura 2**) muestra en la región ecuatorial un predominio de ATSM entre $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (condición neutra), con presencia de focos fríos y cálidos ($\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$) en la franja ecuatorial producto de un tren de ondas que se está intensificando. Un foco cerca de la costa en Ecuador de ATSM que cambió de negativas a positivas, mientras que, en el Pacífico sudamericano, se debilitaron los focos de ATSM positivas tanto en la costa peruana como chilena.

EN RELACIÓN A LA CONDICIÓN SEMANAL DE LA COSTA CHILENA:

En la **ZONA NORTE** (**Figura 1a**), durante la semana 35, la condición oceanográfica costera cambió de cálida a neutra (**Figura 3**), con una ATSM promedio semanal en la subzona norte de $+0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+1\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la semana anterior) y $+0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la subzona sur ($+0,9\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la semana anterior). La distribución semanal de las ATSM (**Figura 1a, panel derecho**) mostró un predominio de valores neutros y escasos focos de ATSM positivos ($+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$) en la costa y área cercana a esta. En resumen, durante la semana 35, la costa de la **ZONA NORTE** presentó una condición neutra.

En la **ZONA CENTRO-NORTE** (**Figura 1b**), durante la semana 35 se debilitó la condición cálida en la costa en relación a las semanas anteriores (**Figura 3**), con un valor de ATSM promedio semanal de $+0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la subzona norte ($+0,7\text{ }^{\circ}\text{C}$ la semana anterior, cálida) y de $+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la subzona sur ($+1\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la semana anterior). La distribución de la ATSM (**Figura 1b, panel derecho**) mostró una disminución de los focos de valores positivos ($+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$) tanto en la costa los que se ubicaron entre los 26°S y 31°S , como en el sector oceánico. En resumen, durante la semana 35, la costa de la **ZONA CENTRO-NORTE** presentó una condición neutra con tendencia cálida en la subzona norte y cálida en la subzona sur.

Evolución en las últimas 20 semanas (Figura 3):

Durante el período analizado (abril a agosto de 2025), en la zona costera del país se observan transiciones progresivas, predominando condiciones neutras desde la semana 25 en todas las zonas, cambiando a condiciones cálidas desde Arica hasta los 40°S a comienzos de agosto.

ZONA NORTE: La condición en la **subzona norte** transitó de fría en la tercera semana de abril a cálida en la segunda semana de mayo, pasando a neutra desde la tercera semana de junio, para volver a cálida desde la

cuarta semana de julio a la tercera semana de agosto. En contraste, en la **subzona sur** predominó una condición cálida hasta la segunda semana de junio, pasando luego a neutra, y volviendo a cálida desde la última semana de julio a la tercera de agosto.

ZONA CENTRO NORTE: En la **subzona norte** y la **subzona sur** predominaron condiciones neutras hasta julio, y cálidas en agosto.




Figura 1. Series de tiempo diarias del promedio de la ATSM registrada en las primeras 20 mn de distancia a la costa (paneles izquierdos), de la ZONA NORTE (a) y CENTRO-NORTE (b) de Chile. Cada zona fue dividida en una subzona norte (línea naranja) y subzona sur (línea verde). Se incluye el valor promedio de ATSM semanal de cada subzona (texto con el color respectivo). La línea negra es la serie promedio mensual de ATSM de la región Niño 1+2 y la línea con círculos corresponde a ATSM de la región Niño 3.4. El panel derecho (mapa) muestra la distribución espacial de la ATSM promedio de la semana 35. La línea negra horizontal divide la zona en la subzona norte y sur. La línea negra punteada paralela a la costa, indica en los mapas las primeras 20 mn, área de donde se obtiene el valor de ATSM promedio diario y semanal. La información de ATSM fue extraída del producto MUR, calculadas en base a la climatología de TSM satelital del periodo 2002 – 2025, provenientes de la plataforma SAPO-Chile (IFOP).




Figura 2. ATSM océano Pacífico - costa sudamericana del 2 de septiembre de 2025. La información de ATSM fue extraída del producto MUR, calculadas en base a la climatología de TSM satelital del periodo 2002 – 2025, provenientes de la plataforma SAPO-Chile (IFOP).




Figura 3. Desarrollo de las condiciones oceanográficas superficiales semanales de la ATSM por subzona (norte y sur) en la ZONA: NORTE y CENTRO-NORTE de Chile en el periodo de las últimas 20 semanas (entre la semana 16: tercera semana de abril y la semana 35: cuarta semana de agosto de 2025).

Referencias

NOAA, 2025. El Niño/Oscilación del sur (ENOS), discusión diagnóstica. 14 de agosto de 2025.
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_disc_aug2025/ensodisc_Sp.pdf

SAPO. Sistema de Alerta, Predicción y Observación.
<https://sapo.ifop.cl/>