



MONITOREO REPRODUCTIVO SEMANA N° 39

(XV, I, II REGIONES)

(25 septiembre al 1 octubre 2017)

Convenio de Desempeño 2017

Programa de Seguimiento de las Pesquerías Pelágicas Zona Norte

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMT / Octubre 2017

REQUIRENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Jefa Subsecretaría de Economía y EMT

Natalia Piergentili Domenech

EJECUTOR

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, IFOP

Director Ejecutivo

Leonardo Núñez Montaner

Jefe División Investigación Pesquera

Mauricio Gálvez Larach

JEFA PROYECTO

M. Gabriela Böhm Stoffel

AUTOR

Eduardo Díaz Ramos

Laboratorio Biol. Reproductiva - Iquique



Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta

Esta actividad consiste en el seguimiento macroscópico (mediante el IGS) y microscópico (mediante el IHA, IAD e IAO) de la evolución semanal del proceso de maduración gonadal y de desove de la anchoveta en la Zona Norte. A partir de la semana 23 (5 al 11 junio, 2017) se da inicio al monitoreo reproductivo intensivo entre la XV y II Regiones.

En la Semana 39 el análisis histológico se sustentó de 318 hembras (7 muestreos), las que fueron recolectadas mediante la prospección en el marco de la ejecución de una Pesca de Investigación, debido a que el recurso se encuentra con veda biológica, según Artículo 2° de D. EX. N° 749. Las zonas prospectadas abarcaron los sectores norte y sur de Arica, Iquique y Mejillones, con 7 lances efectivos de un total de 24 lances realizados, de los cuales, 3 lances efectivos se obtuvieron con el apoyo de la prospección del proyecto de MPDH que operó en la Zona de Arica. Las hembras recolectadas correspondieron principalmente a la Zona de Arica, mientras que en Iquique se contó con un lance efectivo de un total de 12 lances (**Tabla 1**). Importante señalar que la información del personal abordó indica un ambiente pobre de anchoveta y con presencia de agua fría, lo que ha dificultado la obtención muestras. En la Zona de Arica los tamaños fluctuaron entre 10,5 y 14,0 cm (41% < 12,0 cm; moda 12,0 cm) y en la Zona de Iquique de 11,0 a 13,0 cm (69% < 12,0 cm; moda 11,5 cm).

Tabla 1

Zonas prospectadas y lances realizados en el marco de la Pesca de Investigación, semana 39.

Zona	Zarpe	Recalada	Lance	Ubicación		Efectivo	No efectivo
Arica	27-sep	28-sep	1	19°12'	70°18'	X	
			2	18°58'	70°22'	X	
	Valencia	28-sep	29-sep	3	18°49'	70°27'	
1				18°26'	70°20'	X	
2				18°22'	70°22'		X
Apoyo MPH	28-sep	29-sep	3	18°26'	70°25'		X
			1	18°28'	70°31'	X	
			4	18°23'	70°21'	X	
			6	18°21'	70°24'	X	
Iquique Kairos	25-sep	27-sep	1	20°27'	70°12'		X
			2	20°48'	70°12'		X
			3	21°17'	70°04'		X
			4	20°36'	70°11'		X
			5	20°25'	70°11'		X
			6	20°18'	70°13'		X
	30-sep	02-oct	1	19°30'	70°15'		X
			2	19°30'	70°16'		X
			3	19°44'	70°13'	X	
			4	19°47'	70°13'		X
			5	19°53'	70°10'		X
			6	19°57'	70°09'		X
Mejillones Génesis	25-sep	26-sep	1	23°19'	70°36'		X
			2	23°38'	70°27'		X
			3	23°01'	70°25'		X

Nota: Se incorporaron 3 lances obtenidos en el marco de la ejecución del MPDH-MOBIO. La muestra de la segunda salida del Kairos corresponde al día 1 de octubre.



Índice gonadosomático (IGS)

El índice gonadosomático se mantiene alto, con un registro sobre 5% referencial, hecho que señala que la anchoveta en la Zona Norte se encuentra en desarrollo del evento reproductivo, pero destacando entre junio y mediados de agosto registros bajo el patrón histórico (**Tabla 2; Figura 1**).

Tabla 2
Índices reproductivos de la anchoveta en la Zona Arica-Antofagasta.

Anchoveta de la Zona Arica-Antofagasta						
Semana (N°)	Fecha 2017	Macroscópico		Microscópico		
		IGS	n	IAD	IAO	n
23	05/06 - 11/06	2,9	47	4,3	6,4	47
24	12/06 - 18/06	2,1	124	1,1	0,0	90
25	19/06 - 25/06					
26	26/06 - 02/07	3,1	431	8,6	5,6	304
27	03/07 - 09/07	3,9	528	11,8	1,0	296
28	10/07 - 16/07	2,5	117	0,0	20,0	120
29	17/07 - 23/07	4,8	413	7,7	8,3	300
30	24/07 - 30/07	5,1	378	6,6	0,7	303
31	31/07 - 06/08	5,2	342	15,0	13,6	213
32	07/08 - 13/08	5,2	115	42,0	0,0	131
33	14/08 - 20/08	5,8	361	34,3	0,3	318
34	21/08 - 27/08	5,6	113	18,4	0,7	152
35	28/08 - 03/09	Veda				
36	04/09 - 10/09	Veda				
37	11/09 - 17/09	Veda				
****38	18/09 - 24/09	6,1	234	30,3	0,4	274
39	25/09 - 01/10	6,0	175	29,6	0,0	318

****: Indicadores actualizados, se incrementó cobertura y n° hembras con Zona de Arica y Antofagasta




Figura 1 Evolución del índice gonadosomático (IGS) años 2016 – 2017 y serie histórica 2000 – 2016. (La línea segmentada representa el valor IGS 5% referencial del evento reproductivo).



Índice de hembras activas (IHA)

La incidencia de hembras sexualmente activas se mantiene acorde al patr3n hist3rico, que se caracteriza por sobre 90% de hembras en proceso de maduraci3n gonadal a partir de julio (**Figura 2**).




Figura 2 Incidencia de hembras sexualmente activas (IHA) años 2016 – 2017 y serie hist3rica 2001 – 2016.

Índice de actividad de desove (IAD)

El IAD fue 30%, lo que señal3 una alta intensidad de desove, hecho esperable de acuerdo a la tendencia del indicador en este periodo. Importante indicar, que los registros en el bimestre junio – julio se ubicaron muy por debajo del patr3n hist3rico (**Tabla 2; Figura 3**).




Figura 3 Evoluci3n del índice de actividad de desove (IAD) años 2016 – 2017 y serie hist3rica 1999 – 2016. (La lnea segmentada representa el umbral de IAD 25% que define el periodo de los mayores desoves o de la MID).



Índice de atresia ovárica (IAO)

El IAO fue 0%, hecho acorde al patr3n hist3rico que señaala una mínima o nula incidencia de atresia en el periodo de incremento de la actividad ovárica (IHA) y de desove (**Tabla 2; Figura 4**).




Figura 4 Evoluci3n del índice de atresia ovárica (IAO) ańos 2016 – 2017 y serie hist3rica 1999 – 2016.

Consideraci3n final

Según los indicadores en la semana 39, la anchoveta en zonas de Arica e Iquique se mantiene en desarrollo del evento reproductivo, con indicadores de actividad (IGS - IHA) sobre el umbral y mínima incidencia de atresia (IAO), las que evidenciaron para el área una alta intensidad de desove (IAD), hecho esperable de acuerdo a la tendencia hist3rica en este periodo.

En este ańo se destacan registros de actividad (IGS – IHA) y de desove (IAD) bajo el patr3n hist3rico (junio – julio), hecho que significó un retraso en el inicio del evento reproductivo, lo que fue consecuente con valores inusuales de atresia (IAO).

Glosario:

Índice gonadosomático (IGS): indicador de actividad que cuantifica los cambios del peso del ovario producto del desarrollo de los ovocitos.

Índice de hembras activas (IHA): indicador de actividad (histol3gico), como una proporci3n de hembras que evidencian alg3n grado de desarrollo de ovocitos, sin atresia masiva.

Índice de actividad de desove (IAD): indicador de la intensidad de desove (histol3gico), como una proporci3n de hembras que presentan ovocitos hidratados y/o folículos postovulatorios de estadios I-IV (hembras desovantes en la misma noche y/o una noche anterior a la captura).

Índice de atresia ovárica (IAO): indicador de atresia ovocitaria masiva (>50%), que refleja la finalizaci3n del evento reproductivo o alg3n factor perturbador del proceso de maduraci3n gonadal y del desove.